

جرعة الأسيتامينوفين (تايلينولTM، فيفيرالTM) مُسكن الألم والحمى

Acetaminophen (TylenolTM, FeverallTM) Dosage for Fever and Pain (Arabic)

- راجع تركيز الدواء واختر العمود المطابق له من الجدول أدناه.
- استخدم القطارة المرفقة بالداخل فقط أو كوب الدواء المرفق مع المنتج. (ملاعق المطبخ الصغيرة ليست معيارًا دقيقًا للدواء).
- يُمكن تناول الجرعة كل 4 ساعات. لا يُستخدم أكثر من 5 مرات خلال مدة 24 ساعة.

تُستخدم الاختصارات التالية في جدول الجرعات هذا:

ملليغرام (ملغم)

ملليتر (مل)

لا ينطبق (-) -: يحظر تقديم هذا الشكل الدوائي لأطفال بهذا الوزن.

الدليل الإرشادي لجرعة الأسيتامينوفين (تايلينولTM، وفيفيرالTM)

| وزن الطفل (تقريبًا بالباوند) | السنابل 160 ملغم/5 مل | قرص 80 ملغم قابل للمضغ أو الذوبان في الفم للأطفال | قرص 160 ملغم قابل للمضغ أو الذوبان في الفم بقوة مناسبة للصغار | قرص 325 ملغم للبالغين | قرص 500 ملغم ذو القوة الإضافية للبالغين |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------|---|
| من 2.7 إلى 5.4 كغ (من 6 إلى 11 باوند) | 1.25 مل (40 ملغم) | -- | -- | -- | -- |
| من 5.5 إلى 8.1 كغ (من 12 إلى 17 باوند) | 2.5 مل (80 ملغم) | 1 قرص (80 ملغم) | -- | -- | -- |
| من 8.2 إلى 10.8 كغ (من 18 إلى 23 باوند) | 3.75 مل (120 ملغم) | 1½ قرص (120 ملغم) | -- | -- | -- |
| من 10.9 إلى 16.3 كغ (من 24 إلى 35 باوند) | 5 مل (160 ملغم) | قرصان (160 ملغم) | قرص واحد (160 ملغم) | -- | -- |
| من 16.4 إلى 21.7 كغ (من 36 إلى 47 باوند) | 7.5 مل (240 ملغم) | 3 أقراص (240 ملغم) | 1½ قرص (240 ملغم) | -- | -- |
| من 21.8 إلى 27.2 كغ (من 48 إلى 59 باوند) | 10 مل (320 ملغم) | 4 أقراص (320 ملغم) | قرصان (320 ملغم) | قرص واحد (325 ملغم) | -- |
| من 27.3 إلى 32.6 كغ (من 60 إلى 71 باوند) | 12.5 مل (400 ملغم) | 5 أقراص (400 ملغم) | 2½ قرص (400 ملغم) | قرص واحد (325 ملغم) | -- |
| من 32.7 إلى 43.1 كغ (من 72 إلى 95 باوند) | 15 مل (480 ملغم) | 6 أقراص (480 ملغم) | 3 أقراص (480 ملغم) | 1½ قرص (487.5 ملغم) | قرص واحد (500 ملغم) |
| من 43.2 إلى 66.4 كغ (من 95 إلى 146 باوند) | 20 مل (640 ملغم) | 8 أقراص (640 ملغم) | 4 أقراص (640 ملغم) | قرصان (650 ملغم) | قرص واحد (500 ملغم) |