



Dosis de acetaminofén (Tylenol™, Feverall™) para la fiebre y el dolor

Acetaminophen (Tylenol™, Feverall™)

Dosage for Fever and Pain (Spanish)

- Revise la concentración del medicamento y seleccione la columna correspondiente en la tabla a continuación.
- Use **únicamente** el gotero o el recipiente que se incluye con el producto. (Las cucharitas de uso doméstico no sirven para medir con exactitud el medicamento).
- Las dosis se pueden administrar cada 4 horas. No debe administrarse más de 5 veces en un período de 24 horas.

En la tabla de dosis, se utilizan las siguientes abreviaturas:

Miligramo (mg)

Mililitro (ml)

No corresponde (– –): esta presentación del medicamento no debe administrarse a niños con este peso.

Pautas para la administración de la dosis de acetaminofén (Tylenol™, Feverall™)					
Peso del niño (en kilogramos y libras aproximadas)	Jarabe líquido de 160 mg/5 ml	Tableta masticable o soluble de 80 mg para niños	Tableta masticable o soluble Junior Strength de 160 mg	Tableta de 325 mg para adultos	Tableta Extra Strength de 500 mg para adultos
De 2,7 a 5,4 kg (de 6 a 11 libras)	1,25 ml (40 mg)	– –	– –	– –	– –
De 5,5 a 8,1 kg (de 12 a 17 libras)	2,5 ml (80 mg)	1 tableta (80 mg)	– –	– –	– –
De 8,2 a 10,8 kg (de 18 a 23 libras)	3,75 ml (120 mg)	1 ½ tableta (120 mg)	– –	– –	– –
De 10,9 a 16,3 kg (de 24 a 35 libras)	5 ml (160 mg)	2 tabletas (160 mg)	1 tableta (160 mg)	– –	– –
De 16,4 a 21,7 kg (de 36 a 47 libras)	7,5 ml (240 mg)	3 tabletas (240 mg)	1 ½ tableta (240 mg)	– –	– –
De 21,8 a 27,2 kg (de 48 a 59 libras)	10 ml (320 mg)	4 tabletas (320 mg)	2 tabletas (320 mg)	1 tableta (325 mg)	– –
De 27,3 a 32,6 kg (de 60 a 71 libras)	12,5 ml (400 mg)	5 tabletas (400 mg)	2 ½ tabletas (400 mg)	1 tableta (325 mg)	– –
De 32,7 a 43,1 kg (de 72 a 95 libras)	15 ml (480 mg)	6 tabletas (480 mg)	3 tabletas (480 mg)	1 ½ tableta (487,5 mg)	1 tableta (500 mg)
De 43,2 a 66,4 kg (de 95 a 146 libras)	20 ml (640 mg)	8 tabletas (640 mg)	4 tabletas (640 mg)	2 tabletas (650 mg)	1 tableta (500 mg)