

- ينبغي عدم إعطاء الأيبوبروفين للأطفال الأقل من 6 أشهر دون استشارة مزود الرعاية الصحية.
- في حالة إعطاء جرعة أقل من 100 ملغم، استخدم قطرات الرضع.
- يُمكن إعطاء الجرعة كل 6 أو 8 ساعات. لا يُستخدم أكثر من 4 مرات خلال مدة 24 ساعة.
- استخدم القطارة المرفقة بالداخل فقط أو كوب الدواء المرفق مع المنتج. (ملاعق المطبخ الصغيرة ليست معيارًا دقيقًا للدواء.)

تُستخدم الاختصارات التالية في جدول الجرعات هذا:

ملليغرام (ملغم)

ملليتر (مل)

-- غير منطبق: ينبغي عدم إعطاء هذا الدواء للأطفال الذين تبلغ أوزانهم هكذا.

دليل إرشادي لجرعة الأيبوبروفين (آدفيل [™] ، موتريين [™])					
وزن الطفل (تقريبًا بالباوند)	قطرات الرضع 50 ملغم في كل قطرة (1,25 مل)	مستعلق فموي للأطفال 100 ملغم/5 مل	قرص قابل للمضغ للأطفال 50 ملغم	للصغار كبسولة أو قرص قابل للمضغ 100 ملغم	قرص للبالغين 200 ملغم
من 5,5 إلى 8,1 كغ (من 12 إلى 17 باوند)	50 ملغم في كل قطرة (1,25 مل)	--	--	--	--
من 8,2 إلى 10,8 كغ (من 18 إلى 23 باوند)	75 ملغم في كل قطرة ونصف (1,875 مل)	--	--	--	--
من 10,9 إلى 16,3 كغ (من 24 إلى 35 باوند)	--	5 مل (100 ملغم)	قرصان (100 ملغم)	قرص واحد (100 ملغم)	--
من 16,4 إلى 21,7 كغ (من 36 إلى 47 باوند)	--	7,5 مل (150 ملغم)	3 أقراص (150 ملغم)	قرص ونصف (150 ملغم)	--
من 21,8 إلى 27,2 كغ (من 48 إلى 59 باوند)	--	10 مل (200 ملغم)	4 أقراص (200 ملغم)	قرصان (200 ملغم)	قرص واحد (200 ملغم)
من 27,3 إلى 32,6 كغ (من 60 إلى 71 باوند)	--	12,5 مل (250 ملغم)	5 أقراص (250 ملغم)	2 1/2 قرص (250 ملغم)	قرص واحد (200 ملغم)
من 32,7 إلى 43,1 كغ (من 72 إلى 95 باوند)	--	15 مل (300 ملغم)	6 أقراص (300 ملغم)	3 أقراص (300 ملغم)	قرص ونصف (300 ملغم)
أكبر من 43,1 كغ (أكبر من 95 باوند)	--	20 مل (400 ملغم)	8 أقراص (400 ملغم)	4 أقراص (400 ملغم)	قرصان (400 ملغم)