

**No se les debe dar ibuprofeno a bebés menores de 6 meses sin indicación del proveedor de atención médica.**

- Si se da **menos de** 100 mg, se deben usar las gotas para bebés.
- La dosis se puede administrar cada 6 a 8 horas, sin superar las 4 dosis en 24 horas.
- Utilice **únicamente** el gotero o cuentagotas del envase o el vasito dosificador que viene con el producto. (Las cucharitas de uso doméstico no sirven para medir con exactitud el medicamento).

En la tabla de dosis se utilizan las siguientes abreviaturas:

Miligramo (mg)

Mililitro (ml)

-- No corresponde: el medicamento con esa formulación no se debe administrar a niños con ese peso.

| Guía para la administración de ibuprofeno (Advil™, Motrin™) |                                             |                                        |                                        |                                                        |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Peso aproximado del niño (en kilogramos y libras)           | Gotas para bebés 50 mg por gotero (1,25 ml) | Suspensión oral para niños 100 mg/5 ml | Comprimido masticable para niños 50 mg | Comprimido oblongo o masticable Junior strength 100 mg | Comprimido para adultos 200 mg |
| De 5,5 a 8,1 kg (de 12 a 17 libras)                         | 1 gotero (50 mg) (1,25 ml)                  | --                                     | --                                     | --                                                     | --                             |
| De 8,2 a 10,8 kg (de 18 a 23 libras)                        | 1 1/2 gotero (75 mg) (1,875 ml)             | --                                     | --                                     | --                                                     | --                             |
| De 10,9 a 16,3 kg (de 24 a 35 libras)                       | --                                          | 5 ml (100 mg)                          | 2 comprimidos (100 mg)                 | 1 comprimido (100 mg)                                  | --                             |
| De 16,4 a 21,7 kg (de 36 a 47 libras)                       | --                                          | 7,5 ml (150 mg)                        | 3 comprimidos (150 mg)                 | 1 1/2 comprimido (150 mg)                              | --                             |
| De 21,8 a 27,2 kg (de 48 a 59 libras)                       | --                                          | 10 ml (200 mg)                         | 4 comprimidos (200 mg)                 | 2 comprimidos (200 mg)                                 | 1 comprimido (200 mg)          |
| De 27,3 a 32,6 kg (de 60 a 71 libras)                       | --                                          | 12,5 ml (250 mg)                       | 5 comprimidos (250 mg)                 | 2 1/2 comprimidos (250 mg)                             | 1 comprimido (200 mg)          |
| De 32,7 a 43,1 kg (de 72 a 95 libras)                       | --                                          | 15 ml (300 mg)                         | 6 comprimidos (300 mg)                 | 3 comprimidos (300 mg)                                 | 1 1/2 comprimido (300 mg)      |
| Más de 43,1 kg (más de 95 libras)                           | --                                          | 20 ml (400 mg)                         | 8 comprimidos (400 mg)                 | 4 comprimidos (400 mg)                                 | 2 comprimidos (400 mg)         |